



อาการไม่พึงประสงค์ ทั่วไป

เป็นสัญญาณว่า ระบบภูมิคุ้มกัน
กำลังเริ่มทำงานเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค



อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น
“ปวด บวม แดง ร้อน
บริเวณที่ฉีด”
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน

ส่วนใหญ่หายเองใน 1-3 วัน





ထိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်
ကိုဗစ် တိုက်ဖျက်ရန်
ကာကွယ်ဆေး

မျှော်လင့်မထားသော တုံ့ပြန်မှုအများစုမှာ

မိမိတို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းရှိ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည်
ရောဂါပိုးကို စတင်တိုက်ခိုက်ရန် အချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။



ဖြူဖတ်ဖြူလျော်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊
“ဆေးထိုးထားသည့်အနီးတဝိုက်တွင် နာကျင်ခြင်း၊
ယောင်ရမ်းခြင်း၊ နီခြင်း၊ ပူခြင်းများ”
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပြီး

အများစုသည် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းသည်။

